

## FARMACI A RISCHIO DI PRESCRIZIONE IMPROPRIA

FARMACO		Indicazioni improprie (non autorizzate dall'AIFA)	Indicazione scheda tecnica
Principio attivo	Nomi commerciali		
Alendronato 70 mg	Adronat - Alendros Alenic – Aston - Doryx Dralenos – Dronal Fosamax – Genalen Glamor – Loss Nofratil – Porodron Realen – Ac. alendronico (Fg – Fidia – Germed – S.g.) Alendronato (Ahcl – Alin – Alter – Arrow – Doc g. – Eg – M.g. – Pensa – Ranb.it Ratio – Sandoz – Teva)	- Trattamento della osteoporosi nell'uomo - Indicazioni non ricomprese nella nota AIFA 79	- Trattamento della osteoporosi post- menopausale
Ranelato di stronzio	Osseor - Protelos	- Trattamento della osteoporosi nell'uomo - Indicazioni non ricomprese nella nota AIFA 79	- Trattamento della osteoporosi post- menopausale
Ibandronato	Bonviva	- Trattamento della osteoporosi nell'uomo - Indicazioni non ricomprese nella nota AIFA 79	- Trattamento della osteoporosi post- menopausale
Raloxifene	Evista - Optruma	- Trattamento della osteoporosi nell'uomo - Indicazioni non ricomprese nella nota AIFA 79	- Trattamento della osteoporosi post- menopausale
Risedronato 5 mg e 75 mg	Actonel – Avestra Optinate	- Trattamento della osteoporosi nell'uomo - Indicazioni non ricomprese nella nota AIFA 79	- Trattamento della osteoporosi post- menopausale
<b>Farmaci autorizzati nel trattamento dell'osteoporosi nell'uomo:</b> - ALENDRONATO 10 mg - RISEDRONATO 35 mg			
Neridronato	Nerixia	- Trattamento dell'osteoporosi	- Osteogenesi imperfetta - Morbo di Paget
Tamoxifene	Kessar -Nolvadex – Nomafen - Tamoxifene (Auro – Dexo – Eg – Ratio)	- Trattamento del carcinoma prostatico	- Trattamento del carcinoma mammario
Ketorolac Fiale	Lixidol – Tora dol Nasvical – Rolacsin Benketol – Kevindol Ketorolac (Actavis – Doc – Dr. K. – Eg – Fg - Pen – Sandoz)	- Trattamento superiore ai 2 giorni - Altre indicazioni non previste in scheda tecnica	- Trattamento a breve termine (massimo 2 giorni) del dolore acuto post-operatorio di grado moderato-severo - Trattamento del dolore dovuto a coliche renali

FARMACO		Indicazioni improprie (non autorizzate AIFA)	Indicazione scheda tecnica
Principio attivo	Nomi commerciali		
Flutamide	Eulexin – Fluprost Flutamide (Auro – Eg – Fidia – Hexal – Mg – Teva) - Ricalide	- Trattamento dell'irsutismo - Trattamento dell'acne - Ipoplasi mammaria nella donna	- Trattamento del carcinoma prostatico in stadio avanzato
Ciproterone acetato	Androcur	- Trattamento dell'irsutismo - Trattamento dell'acne	- Trattamento del carcinoma prostatico inoperabile - Riduzione dell'istinto patologicamente aumentato o alterato nell'uomo adulto
Leuprorelina Triptorelina	Enantone - Eligard Decapeptyl Gonapeptyl	- Nei protocolli per la fecondazione assistita	- Carcinoma della prostata e suoi secondarismi - Endometriosi a localizzazione genitale ed extra-genitale (stadi I – IV) - Carcinoma della mammella in donne in pre e peri- menopausa, ove indicato il trattamento ormonale - Fibromi uterini in operabili - Terapia pre-chirurgica: durata 3 mesi per gli interventi di miomectomia e isterectomia nella paziente metrorragica; durata 1 mese per gli interventi di ablazione endometriale e di resezione dei setti endouterini per via endoscopica - Pubertà precoce (prima degli 8 anni nella femmina e prima dei 10 anni nel maschio)
Buserelina	Suprefact	- Nei protocolli per la fecondazione assistita	- Carcinoma della prostata e suoi secondarismi
Ossigeno gassoso		- Terapia a lungo termine	- Ossigenoterapia d'urgenza e per breve termine
Ossigeno liquido (da 26500 litri)		- Senza autorizzazione ASL	Durata della fornitura (-10% di tolleranza): 2 l/min x 12 h/die = 16 giorni 2 l/min x 16 h/die = 12 giorni 2 l/min x 18 h/die = 11 giorni 3 l/min x 12 h/die = 11 giorni 3 l/min x 16 h/die = 8 giorni 3 l/min x 18 h/die = 7 giorni

FARMACO		Indicazioni improprie (non autorizzate AIFA)	Indicazione scheda tecnica
Principio attivo	Nomi commerciali		
Clopidogrel (equivalente) (Dr. – Act. Alt. – Doc G. – Eg – Rat. Gmb – Mg Sandoz – Teva ph) – Carder Grepid		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sindrome coronarica acuta senza innalzamento del tratto ST (angina instabile o infarto miocardico senza onda Q) in associazione con ASA (trattamento di 6 mesi rinnovabile per 1-2 volte)</li> <li>- Angioplastica percutanea (PTCA) con applicazione di stent:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a) non medicato: trattamento di 1 mese in associazione a ASA</li> <li>b) medicato: trattamento di 6 mesi in associazione a ASA</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terapia antiaggregante per la prevenzione secondaria dell'infarto miocardico in associazione ad ASA (dai 3 ai 35 gg. dall'evento)</li> <li>- Terapia antiaggregante a lungo termine per la prevenzione secondaria dell'infarto miocardico e dell'ictus in pazienti per i quali esiste la controindicazione a ASA o ticlopidina</li> </ul>
<p>Soltanto Plavix (clopidogrel) soddisfa tutte le indicazioni previste dal Piano Terapeutico; pertanto è consigliabile, onde evitare sostituzioni con farmaci equivalenti da parte del farmacista, apporre sulla ricetta la clausola “Non sostituibile” per evitare l'inappropriatezza prescrittiva (logicamente per le sole indicazioni non presenti nella scheda tecnica dei farmaci equivalenti)</p>			
Tutti i Farmaci con Nota AIFA o Piano Terapeutico		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Patologie NON comprese dalla Nota o dal Piano Terapeutico (e dalla scheda tecniche del farmaco)</li> <li>- Durata superiore ad 1 anno (o illimitata) per i farmaci con Piano Terapeutico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Patologie comprese dalla Nota o dal Piano Terapeutico (e dalla scheda tecnica del farmaco)</li> <li>- Per la durata massima di 1 anno per farmaci con Piano Terapeutico</li> </ul>
		<b>AD ESEMPIO</b>	
Ranitidina	Raniben – Ranibloc – Ranidil – Ulcex - Zantac – Gipsy – Livin – Sensigard - Ranitidina (Abc – Ts - Ang. – Art. – Alt. - Doc – Dr. Red – Eg – Ger. – Hexal – Jet g. - M.G. – Magis – Ranb. – Ratio – Sandoz – Teva)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gastroprotezione da FANS</li> <li>- Gastroprotezione da ASA e da ASA + Clopidogrel</li> </ul>	<p><u>Durata del trattamento 4 sett. (occasionalmente 6 sett.):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ulcera duodenale o gastrica positiva per H.pylori</li> <li>- malattia da reflusso gastro-esofageo con o senza esofagite (1° episodio)</li> </ul> <p><u>Durata del trattamento prolungata (da rivalutare dopo 1 anno):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sindrome di Zollinger-Ellison</li> <li>- ulcera duodenale o gastrica H. pylori negativa recidivante</li> <li>- malattia da reflusso gastro-esofageo con o senza esofagite (recidivante)</li> </ul>
Rabeprazolo	Pariet		
Roxatidina	NeoH2 Roxit		
Famotidina	Famodil – Gastridin Motiax – Famotidina		
Nizatidina	Cronizat - Nizax		
Cimetidina	Biomag – Cimetidina Teva – Tagamet – Dina – Ulcedin - Ulis		